***Thermus thermophilus* HB8 由来 新規ペプチダーゼ複合体の X 線結晶構造解析**
X-ray Crystallography of a Novel Peptidase Complex from *Thermus thermophilus* HB8

大塚 淳¹, 窪田 恵子¹, 山村 昭裕¹, 杜 垚¹, 堀田 彰一朗¹, 明 華¹,

永田 宏次^{1,2}, 田之倉 優^{1,2}

Jun Ohtsuka¹, Keiko Kubota¹, Akihiro Yamamura¹, Yao Do¹, Shoichiro Horita¹, Hua Ming¹,

Koji Nagata^{1,2}, and Masaru Tanokura^{1,2}

(¹東大院・農生科, ²理研播磨)

(¹Grad. Sch. of Agric. Life Sci., Univ. of Tokyo, ²RIKEN Harima Institute at SPring-8.)

e-mail: aa67011@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

ペプチダーゼ M16 ファミリーは生物界に広く分布する亜鉛などの金属依存性ペプチダーゼのひとつであり、インシュリン分解酵素 (IDE) やミトコンドリアへの輸送シグナルのプロセッシング酵素 (MPP) などが含まれている。M16 ファミリーに共通の特徴として、金属結合モチーフ HxxEH の存在と、4 回の繰り返し構造を持つことが知られている。M16 ファミリーには 3 つのサブクラス M16A、M16B、M16C が存在している。1 本のポリペプチド鎖が 4 つの繰り返し単位を含むグループは M16A と M16C、1 本のポリペプチド鎖が 2 つの繰り返し単位を持っているグループは M16B に分類されている。M16B は金属結合モチーフを持つβサブユニットと金属結合モチーフを持たないαサブユニットからなるヘテロダイマーとして機能する酵素が多く報告されている。IDE は M16A、MPP は M16B に分類されている。

図 1 M16 ファミリーのドメイン構成の比較

図 2 Zinc protease $\alpha\beta$ 複合体の構造

Thermus thermophilus HB8 のゲノム配列より M16 ファミリーに含まれるタンパク質をアミノ酸配列の類似性から検索すると、2 つの ORF が該当することがわかる。いずれも繰り返し単位を 2 つ持っていることや、アミノ酸配列の相同性から、M16B に分類される。一方は金属結合モチーフ HxxEH を持つβタイプであり、もう一方は金属結合モチーフを持たないαタイプである。我々はこれらのタンパク質を zinc protease α 、zinc protease β と名づけ、単独および複合体の結晶構造を決定した。複合体形成によって引き起こされる構造変化や機能について、報告する予定である。